

エコライフ通信 No.72



059-1305

苫小牧市沼ノ端中央3丁目15番11号

2020年1月発行

☎ 0144-55-0228

🌐 <https://www.magocoro-gas.co.jp>

新年あけましておめでとうございます。

昨年とは格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年も何卒宜しく願い申し上げます。

昨年9月には、恒例行事となりました『大感謝祭』を開催し、お客様に日頃の感謝をこめ各種機器類のご紹介だけではなく、とまチョップ等のゆるキャラを招き、来場したお客様に楽しんで頂きました。

また、10月には消費税が10%に増税され、日々の生活において僅かですが重荷になっていると思います。当社としても、より一層お客様にご満足いただける価格で、ガス・灯油などを提供してまいりますのでご理解のほど宜しく願い致します。

そして、昨年5月には新たな元号『令和』となりました。新たな気持ちでこの時代に必要とされる企業としてお客様に満足して頂ける新しいサービス等を職員一同模索し邁進してまいります。

本年も変わらぬご愛顧のほど宜しく願い致します。

令和2年1月

株式会社 工藤燃料
代表取締役会長 工藤 裕司
代表取締役社長 工藤 裕介

プロパンガス価格について

今月の検針時より
1m³ 15円 値上げ
させていただきます

今月の灯油価格(1月10日現在)

1リットル=90円(税別)

99.0円(税込)

急な価格変更がある場合がございます。

お電話にてお問い合わせ下さい。

石油ストーブを毎シーズン正しくお使い頂けていますか？


誤った使い方をしてしまうと、火災、燃焼中・消火直後の高温部でのやけどなどのケガ、一酸化炭素中毒などの事故につながる恐れがあります。

- ★給油時は、必ず消火し、間違いなく灯油を給油してください。
- ★給油後のタンクの口金が確実に閉まっているか確認してください。
- ★1時間に1～2回程度換気を行ってください。
- ★スプレー缶やカセットボンベをストーブの近くに置くのは×!!
- ★洗濯物、布団、カーテン、新聞など可燃物の近くでの使用も×!!
- ★就寝時・外出時は必ず消火の確認を。
- ★小さいお子様、お年寄り、病気の方がいるご家庭は、十分に注意してください。
- ★石油ストーブの換気を目安としては、1時間ごとに1～2回、約5～10分程度おこなうのがよいでしょう。
- ★機器の異常を感じたら使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

暖房機器は正しく使用し、安全快適に冬を過ごしましょう!!

石油ストーブ以外にも一酸化炭素中毒は起こります

…湯沸かし器…



不完全燃焼防止装置のない湯沸かし器や、経年劣化による故障などで、一酸化炭素を発生させることがあります。

なかでも、燃焼ガスを室内に放出する室内開放型の湯沸かし器は注意が必要です。古い年代の器具だと不完全燃焼防止装置が取り付けられていないこともあります。業者に点検してもらい、ご家庭の湯沸かし器に問題がないかを確認しておくようにしてください。

…ガスコンロ…




経年劣化している器具は不完全燃焼の危険性も高まっているため、定期的に業者に点検を依頼するようにするとよいでしょう。


ガスコンロの炎は普段青色です。不完全燃焼を起こしているときは赤色やオレンジ色になります。使用中に炎の色が変わっているのに気づいたら、すぐに炎を消し、換気をしてください。

石油ストーブの換気も大切ですが、湯沸かし器やガスコンロも換気は必須です。

- ★換気扇をまわす
- ★サーキュレーターを使用する
- ★空気の道を作ってすばやく換気
- ★部屋の対角線上の窓を開ける
- ★高低差のある窓を開ける



など、使用時は換気を心がけるようにしましょう。



一酸化炭素中毒とは……

一酸化炭素は、不完全燃焼を起こすことで発生します。酸素が不足している状態で燃焼が起きると不完全燃焼になり、一酸化炭素が発生します。一酸化炭素は無色・無臭で、大変毒性が強いという性質をもっています。発生がわかりにくく、ほんの少しでも吸い込むと、中毒症状により死に至るおそれさえある大変危険なガスです。

空気中の一酸化炭素濃度と中毒症状

一酸化炭素濃度・症状

約0.02%……………2～3時間以内に軽い頭痛がします。

約0.04%……………1～2時間で前頭痛、2.5～3.5時間で後頭痛の症状が出ます。

約0.08%……………45分で頭痛、めまいや吐き気の症状が出て、2時間で失神します。

約0.16%……………20分で頭痛、めまいや吐き気の症状が出て、2時間で失神します。

約0.32%……………5～10分で頭痛やめまいの症状が出て、30分で死亡します。

約0.64%……………1～2分で頭痛やめまいの症状が出て、10～15分で死亡します。

